



Inwentaryzacja zieleni w Baranowie na fragmentach działek o numerach 764 i 802/2

Zlecniodawca: MOFO Architekci MA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Morawskiego 5, 30 -102 Kraków; NIP: 6772305582

Branża: Architektura krajobrazu

Opracowanie: mgr inż. Piotr Drozda, dr inż. arch. kraj. Anna Gałęcka-Drozda

Strefa Zieleni Piotr Drozda

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 64-000 Kościan


biuro@strefa-zieleni.com.pl

www.strefa-zieleni.com.pl

Poznań, maj 2016

Opis obszaru opracowania

Inwentaryzacja została wykonana w związku z planowaną inwestycją na działkach o numerach 764 i 802/2 w Baranowie, powiat kępiński. Działki zajmują powierzchnię około 4,2 ha, z czego powierzchnia zadrzewiona i zakrzewiona zajmuje 1890 m². Stanowi to około 4,5 % powierzchni całkowitej działek. Pozostała część to zbiorowiska łąkowe. Zielen wysoka i średnia koncentruje się w południowej części obszaru opracowania wzdłuż rzeki Jamicy i wzdłuż rowów melioracyjnych przebiegających prostopadłe do Jamicy. Rowy i rzeka stanowią jednocześnie czytelne granice działek. Inwentaryzowana zielen grupuje się w trzech miejscach, które oznaczono jako sekcje 1, 2 i 3.



Ryc. 1. Schemat wskazujący podział na sekcje inwentaryzowanej roślinności.

Zielen wysoką i średnią tworzą rośliny charakterystyczne dla zbiorowisk olsowych i momentami lasu wilgotnego (olsza, brzoza, wierzba, topola, grab, lipa). We wszystkich sekcjach występuje gęsty podszyt z krzewów i samosiewów drzew. Wśród gatunków krzewów dominuje bez czarny i czeremcha pospolita. We wszystkich trzech sekcjach zaobserwowano samosiewy roślin zawleczonych z ogrodów: tj. kasztanowiec, porzeczkę, jabłoń.

SEKCJA 1 zajmuje najmniejszą powierzchnię. Wśród drzew występuje tutaj olsza czarna z niewielką domieszką form drzewiastych czeremchy i bzu. Podszyt jest ograniczony do przestrzeni między pniami drzew.

SEKCJA 2 o największej powierzchni, skupia się we wschodnim rogu między rzeką Jamicą a rowem melioracyjnym. Wśród drzew występuje tutaj największe zróżnicowanie gatunkowe. Dominuje olsza czarna, poza nią zaobserwowano brzozy, lipy, topole i dęba. Olsze grupują się wzdłuż cieków, pozostałe gatunki rosną w pewnym oddaleniu od nich.

SEKCJA 3 należy do najbardziej podmokłych, tutaj zaobserwowano wierzbę białą. Część terenu sekcji jest na tyle podmokła, że nie występuje tam średnie piętro roślinności.

Ogólna dokumentacja fotograficzna



Ryc. 2. Widok na sekcję 3 od strony wschodniej



Ryc. 3. Widok na sekcję 2 od strony wschodniej, widoczne brzozy i olsze



Ryc. 4. Widok na sekcję 1 od strony wschodniej, widoczne olsze i gęsty podszyt



Ryc. 5. Podmokła część sekcji 3



Ryc. 6. Rów melioracyjny dzielący sekcję 2, widoczne olsze i bzy czarne



Ryc. 7. Widok na sekcję 2 od strony zachodniej



Ryc. 8. Sekcja 3, widoczne wierzby rosnące na przy brzegu rzeki Jamicy

Załączniki:

1. Inwentaryzacja zieleni, skala 1:250
2. Tabela inwentaryzacyjna
3. Gospodarka drzewostanem